

(保健・人口省フォームの仮訳:5月30日)

(アラビア語フォームの体裁のままなので、右から左のレイアウトになっています)

(5月30日オセルタミビルの使用中止が決定されましたが、フォームには掲載されたままの可能性があるので、念のため字消線を付けて同医薬品を掲載しています)

新型コロナウイルス感染者(自宅隔離)の経過観察票

以下の医薬品セットの受領を確認すること。

5日目	4日目	3日目	2日目	初日		
					日付	
					合計	医薬品
12時間毎に 1錠	12時間毎に 1錠	12時間毎に 1錠	12時間毎に 1錠	12時間毎に 2錠	12錠	ヒドロキシクロロキン200mg
12時間毎に 1錠	12時間毎に 1錠	12時間毎に 1錠	12時間毎に 1錠	12時間毎に 1錠	40錠	オセルタミビル75mg
高熱が出た時に服用					10錠	パラセタモール500mg
医師が指示した用量、間隔で服用					1瓶	オセルタミビル(シロップ)
医師が指示した用量、間隔で服用					1瓶	アジスロマイシン(シロップ)
高熱が出た時に服用					1瓶	パラセタモール(シロップ)
					1	ハンドジェル
					1	水銀体温計
					5	サージカルマスク

成人
子ども

* 症状に応じ、医師の判断により上記以外の薬を追加される場合があります。

いいえ <input type="checkbox"/>	はい <input type="checkbox"/>	処方薬の必要性
------------------------------	-----------------------------	---------

診断(初回検査)	
	日付

第5回検査 (前回検査から 7日後)	第4回検査 (前回検査から 7日後)	第3回検査 (前回検査から 7日後)	第2回検査 (初回検査から 7日後)	初回検査 (治療開始10日後)	その後の検査
					日付
					結果

(大使館注)

ヒドロキシクロロキン:抗マラリア薬(*1)、オセルタミビル:抗インフルエンザ薬(タミフル)(*2)
 パラセタモール:解熱鎮痛薬(アセトアミノフェン)、アジスロマイシン:抗菌薬:(ジスロマック)

[*1:5月30日、保健・人口省は引き続き、ヒドロキシクロロキンの使用を決定]

[*2:5月30日、保健・人口省は5月30日オセルタミビルの使用中止を決定しましたが、フォームに掲載されたままの可能性があるので、念のため字消線を付けて同医薬品を掲載しています。]